

Dosing Information for Parents and Caregivers

- If possible, use weight to dose; otherwise, use age
- Always ask a healthcare provider which product is right for your child

Información de dosificación para los padres y cuidadores

- Si es posible, use el peso para buscar la dosis, de lo contrario, use la edad.
- Consulte siempre a su proveedor de atención médica sobre qué producto es el correcto para su niño.



Children's TYLENOL® Oral Suspension

Active Ingredient:
Acetaminophen 160 mg
(in each 5 mL or 1 tsp)

Every 4 hours as needed.
**DO NOT GIVE MORE THAN
5 DOSES IN 24 HOURS.**






Ingrediente activo:
Acetaminofén 160 mg
(en cada 5 ml o 1 cdta.)

**Cada 4 horas, según sea
necesario. NO LE DÉ MÁS DE
5 DOSIS EN 24 HORAS.**

mL = milliliter
tsp = teaspoonful

ml = mililitro
cdta. = cucharadita

Use only as directed.
Usar solo según las
indicaciones.

WEIGHT (PESO)	24-35 lbs	36-47 lbs	48-59 lbs	60-71 lbs	72-95 lbs
AGE* (EDAD*)	2-3 yrs/años	4-5 yrs/años	6-8 yrs/años	9-10 yrs/años	11 yrs/años
DOSE (DOSIS)	5 mL (1 tsp/cdta.) 	7.5 mL (1½ tsp/cdta.) 	10 mL (2 tsp/cdta.) 	12.5 mL (2½ tsp/cdta.) 	15 mL (3 tsp/cdta.) 

*For children under 2 yrs., ask a doctor

*Para los niños menores de 2 años, consulte a un médico

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

- Read and follow the label on all TYLENOL® products
- For Children's TYLENOL®, take every 4 hours as needed. Do NOT exceed more than 5 doses in 24 hours
- Do NOT use with any other product containing acetaminophen
- Keep all medicines out of the reach of children
- Do NOT administer adult medicines to children
- For accurate dosing, use only the enclosed measuring cup that comes with the product
- If you have any questions, contact your healthcare professional or call 1-877-895-3665

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO ADECUADO DEL PRODUCTO

- Siga las instrucciones de la etiqueta de todos los productos TYLENOL®
- Children's TYLENOL® debe tomarse cada 4 horas, según sea necesario NO debe administrarse más de 5 dosis en 24 horas
- NO lo use con ningún otro producto que contenga acetaminofén
- Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños
- NO administre medicamentos de adultos a niños
- Para administrar una dosis exacta, use únicamente el vasito de medición que viene con el producto
- Si tiene alguna duda, comuníquese con su proveedor de atención médica o llame al 1-877-895-3665

For more information, visit Tylenol.com

Para más información, visite Tylenol.com



We're Here to Help!

Answers to many other questions about your child's health are available online through the TYLENOL® Health Information video series. Go to <http://www.youtube.com/tylenol> or access the series via your smartphone with the code at right. **Selecciona videos en español.**



Dosing Information for Parents and Caregivers

- If possible, use weight to dose; otherwise, use age
- Always ask a healthcare provider which product is right for your child

Información de dosificación para los padres y cuidadores

- Si es posible, use el peso para buscar la dosis, de lo contrario, use la edad.
- Consulte siempre a su proveedor de atención médica sobre qué producto es el correcto para su niño.



Children's MOTRIN® Oral Suspension

Active Ingredient:

Ibuprofen 100 mg (NSAID)[†]
(in each 5 mL or 1 tsp)

Use only as directed.
Usar solo según las indicaciones.

[†]Nonsteroidal anti-inflammatory drug

Every **6-8 hours** as needed.

DO NOT GIVE MORE THAN 4 DOSES IN 24 HOURS.

mL = milliliter
tsp = teaspoonful






Ingrediente activo:

Ibuprofeno 100 mg (AINE)[†]
(en cada 5 ml o 1 cdta.)

[†]Medicamento antiinflamatorio no esteroide

Cada **6 a 8 horas**, según sea necesario. **NO LE DÉ MÁS DE 4 DOSIS EN 24 HORAS.**

ml = mililitro
cdta. = cucharadita

WEIGHT (PESO)	24-35 lbs	36-47 lbs	48-59 lbs	60-71 lbs	72-95 lbs
AGE* (EDAD*)	2-3 yrs/años	4-5 yrs/años	6-8 yrs/años	9-10 yrs/años	11 yrs/años
DOSE (DOSIS)	5 mL (1 tsp/cdta.) 	7.5 mL (1½ tsp/cdta.) 	10 mL (2 tsp/cdta.) 	12.5 mL (2½ tsp/cdta.) 	15 mL (3 tsp/cdta.) 

*For children under 2 yrs., ask a doctor

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

- Read and follow the label on all MOTRIN® products
- For Children's MOTRIN®, take every 6-8 hours as needed. Do NOT exceed more than 4 doses in 24 hours
- Do NOT administer longer than 10 days, unless directed by a doctor
- Keep all medicines out of the reach of children
- Ask a doctor or pharmacist before use if the child is taking any other drug containing an NSAID (prescription or non-prescription) — MOTRIN® contains ibuprofen
- Do NOT administer adult medicines to children
- For accurate dosing, use only the enclosed measuring cup that comes with the product
- If you have any questions, contact your healthcare professional or call 1-877-895-3665

*Para los niños menores de 2 años, consulte a un médico

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO ADECUADO DEL PRODUCTO

- Siga las instrucciones de la etiqueta de todos los productos MOTRIN®
- Children's MOTRIN® debe tomarse cada 6 a 8 horas, según sea necesario. NO debe administrarse más de 4 dosis en 24 horas
- NO lo administre por más de 10 días, a menos que lo indique su médico
- Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños
- Si el niño está tomando cualquier otro medicamento con AINE (con o sin receta médica), consulte a un médico o farmacéutico antes de usar este producto — MOTRIN® contiene ibuprofeno
- NO administre medicamentos de adultos a niños
- Para administrar una dosis exacta, use únicamente el vasito de medición que viene con el producto
- Si tiene alguna duda, comuníquese con su proveedor de atención médica o llame al 1-877-895-3665

For more information, visit Motrin.com

Para más información, visite Motrin.com